



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES TELEIMPRIMES

DLP 4-9-90024556

003 00089 0267A 00 260913 05923

CNEPS  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE  
DEPARTEMENT DES PERIODIQUES  
56 RUE DE RICHELIEU

75084 PARIS CEDEX 02

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET  
SERVICE REGIONAL  
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
280, RUE DE FOUGERES BP 67128 35067 RENNES CEDEX

## EDITION CULTURES LEGUMIERES

BULLETIN N°194

RENNES LE 24-SEPTEMBRE 1990

### CHOUX

Dans le Nord Finistère, région du Conquet, les attaques de pucerons cendrés sont généralisées à l'ensemble des cultures de choux-fleurs. Les attaques sont faibles à moyennes dans les parcelles ayant déjà été protégées, importantes dans les parcelles non traitées.

Des attaques localisées de piérides, noctuelles et/ou teignes sont parfois trouvées. Elles sont faibles dans la plupart des cas.

Une intervention est à envisager rapidement sur puceron cendré pour maintenir la protection dans les parcelles traitées et stopper les fortes infestations des parcelles non traitées. Les insecticides à utiliser sont ORTHENE 50 ou PIRIMOR. En cas de présence simultanée de pucerons cendrés et/ou piérides, noctuelles, teignes, intervenez avec KARATE K ou complétez l'action d'ORTHENE 50 ou PIRIMOR en employant également un pyréthrinoloïde de synthèse (FASTAC, cyperméthrine, DECIS, KARATE, perméthrine et TALSTAR). Vérifiez la compatibilité des produits avant tout mélange. Contre les chenilles défoliatrices, traitez de préférence le soir.

4050 43158

752